

FINNISH

KÄYTÖÖHOJEET • PIT'Stop

STERILIIT IMPLANT JALKAKIRURGIAAN • KERTAKÄYTTÖINEN

Tätä tuotetta saatavat käsitellä ja/tai istuttaa vain HYVIN PEREHDYTYTETYJÄ PÄTEVÄT HENkilÖT, jotta TUNTE-VAT nämä KÄYTÖÖHOJEET.

1. Lääkinnällisen laitteen kuvaus

PIT'Stop-implanteja on olemassa eri pituisina ja haluaisijoiltaan eri kokoisina. Ne on valmistettu polyeteeteritekeri-ektonista (PEEK) standardin ASTM F2026 mukaisesti. PEEK-implantti sisältää röntgensäteilyläpäismäätön merkeiksi, jotka ovat valmistettu tantaalista ASTM F560:n mukaisesti radiologista arviointia varten. Nämä läitteet ovat tarkoitettu poistettavaksi 12 kuukauden kuluttua implantin asettamisesta tai kasvun lopussa, kun lättää käytetään lapsipotilailla.

Nämä läitteet eivät sisällä röntgenlaitteita, ellei merkeiksiä ole toisin ilmoitettu. Nämä läitteet ovat tarkoitettu poistettavaksi 12 kuukauden kuluttua implantin asettamisesta tai kasvun lopussa, kun lättää käytetään lapsipotilailla.

2. Käyttöäihheet
PIT'Stop-implantti on tarkoitettu käytettäväksi jalan hoitoon, jossa on hyperproaktiivinen sekä subtaarini-velen stabilointi. Se on suunnitel-tu estämään telialuuun eteepäin, alaspäin ja mediaaliseen siirtymään, mikä mahdollistaa subtaarainivelien nor-maaliin liikkeen, mutta estää liiallisen sisäänkierron ja sitä johtuvan jalki-seurauksen.

- Lasten ja nuorten lattajalan hoito - Synnynnäinen lattajalka - Epäoniinistunut pitkäaikainen ortopedinen hoito (kengät, pohjaliiset...) - Tarsaalalaitiot - Kiulius lattajalka - Joustava epänudostuma, toimintahäiriö sääriluun takajänteessä - Paralytinen lattajalka - Subtaalarai epänudostuma

3. Vasta-aheet

Implantti ei saa käyttää potilaalle, jolla on tällä hetkellä tai jolla on aiemmin ollut:

- Akuutteja tai kroonisia tulehdusia, olipaivata ne palkkaa tai

- Aktivisia infektoita, - latta jalas jääkkyä tai kiinteä epänudostuma,

- lattajalka ja jalkaterän abduktio, - sääriluun takajänteiden krooninen repeämä, - oireinen niveltulehdus,

- neurologiset vaivat (alaraajahalvus...), - Herkkyyksiä/allergia implanttimateriaaleja kohtaan (ks. kohta 1).

4. Varoituksset ja varotoimet

Lääkäri on määrittelävä, sopiiko implantti potilaalle, joilla on jokin seuraavista tiloista:

- Huono fysiinis yleiskunto - Luumuoottosia, joita voivat vaarantaa implantin kinnesittymisen jääkykyyn (esimerkkeinä: osteoporosi, aikuutti kystinen muutos, aikuttu osteopenia, luukasvain jne.)

- Steroidijohdannaisen käyttö, kemoterapia, - Huumeja tai alkoholirippuvuus/ja/tai riippuvuus tupakasta ja/tai värinkäytö.

- Liikalihavuus - Heikentynyt haavojen parantumiskyky - Verisonistohäiriöt

- Potilas, joka ei halua tai pysty noudataan lattauksen jälkeisiä ohjeita

Implanttiin soveltuu vain muun muassa seuraavien aihettamuina:

- Implantin läsnäoloon aiheuttama kipu, epämukavuus tai epänormaalit tuntemukset.

- Taipuminen, löystyminen ja/tai rikkoutuminen - Implantin asennon siirtyminen

- Luukato, joka johtuu kuorimustakosta - Toistuvaa epänudostuma, korjauskseen menety

- Infektiot, hematooma, allergia, tromboosi

5. Implantin käyttö

Kirurgisten teknikaiden tuntemuus, implanttiin oikean pienentämisen, välin ja sijaintionsekin seikkaukseen jälkeinen potilaan hoito ovat onnistuneet loppululosken kannalta olen-naisia näkökohtia. Potilaan valintap-risteet ovat kirurgin vastuulla, im-

Jokaisen kirurgin on arvioitava toimenpiteen ja toimenpiteen aikana käytettyjen instrumenttien asianmukaisuuden omien koulutuksensa ja kokemuksensa perusteella.

5.1. Toimenpidetä ennen

- Lue huolellisesti Kirurginen teknikkia.

- Vain In2Bonesin suunnittelemaa ja valmistamaa instrumenttia!

- Valitse lääkintäliiton prototyyppi

- Valitse lääkintäliiton prototyyppi</

După măsurătre, trebuie puse la dispoziție către implanturi din fiecare dimensiune adecvată, pentru a avea inventarul necesar pentru intervenția chirurgicală.

Trebuie pus la dispoziție un implant aditional din fiecare dimensiune pentru a înlocui orice implant care poate fi contaminat accidental în timpul intervenției chirurgicale.

Înainte de prima intervenție chirurgicală, chirurg și asistentii trebuie să manipuleze instrumentele pentru a se familiariza cu materialul.

5.2. Intraoperatori

- Interventia chirurgicală trebuie să fie efectuată de un chirurg cu experiență adecvată în ortopedie și în ceea ce privește diferențele etape prezentate în tehnica chirurgicală.
- Implanturile trebuie să fie manipulate cu grijă pentru a evita zgărieturile (risc de rupere incipientă).
- Implantul nu trebuie să fie modificat în niciun caz.
- În timpul operației, trebuie să fie disponibile și alte metode de fixare.
- Deschiderile setului de instrumente trebuie să fie efectuate conform condițiilor aseptice.
- Verificati integritatea ambalajului și a etichetelor înainte de utilizare.
- Nu utilizati niciun implant căruia ambalaj a fost deschis sau deteriorat în afara sălii de operație. Ambalajul interior trebuie să fie manipulat în condiții sterile (persoane/instrumente).

5.3. Postoperator

- Pacientul trebuie să fie informat că la 12 luni după procedura inițială sau la finalul perioadei de creștere în cazul pacientilor pediatrici, se va efectua încă o procedură pentru îndepărțarea implanturilor.
- Este necesară efectuarea periodică de radiografii pentru a verifica progresul postoperator și a prevenii orice complicație.
- Trebuie să oferă pacientului instrucțiuni detaliate privind utilizarea și limitările dispozitivului. Dacă se recomandă o capacitate parțială de suportare a greutății sau aceasta este necesară înainte de unificarea fermă a oselor, pacientul trebuie să fie avertizat că înălțarea, slabirea sau rupearea componentelor sunt complicații care pot apărea din cauza suportării excesive sau timurii și greutății ori a activității musculare excesive. Îngrijirea postoperatorie și terapia fizică trebuie să fie structurate în aşa fel încât să se prevină încarcătarea extremității operate, până când stabilitatea nu este evidențiată.

- Pacientul trebuie să fie incurajat să-i raporteze chirurghilor orice schimbare neobișnuită a extremității operate. Dacă există indicații de slăbire și implantul (durere specifică și schimbări progresive pe radiografii), se recomandă o programare intensificată a controalelor și să poată necesare avertisamente și instrucțiuni noi pentru pacient în privința restricționării suplimentare a activității.
- Pacientul trebuie să fie incurajat să-i raporteze chirurghilor orice apărare a unei infecții care poate apărea indiferent dacă aceasta apare în membrul operat sau în altă parte a organismului.

5.4. Reutilizare / Resterilizare

- Produsele destinate unei singure utilizări nu trebuie să fie reutilizate (a se vedea simboluri). Reutilizarea poate compromite integritatea structurală a dispozitivului și/sau duce la defecarea dispozitivului, ceea ce poate rezulta în vătămare, imbolnăuire sau decesul pacientului. În plus, reutilizarea unui dispozitiv de unică folosință poate crea riscuri de contaminare încreșătoare între pacienți sau a utilizatorii. Nu trebuie să fie reutilizat niciun implant care a fost murdărit cu sânge, țesuturi și/sau fluid/suflare/substanțe. Trebuie să fie manipulat conform protocolului spitalului. Chiar dacă pot părea nedeterminate, implanturile pot avea defecți și semne de solicitare interioară care pot duce la slabirea materialului.
- Compania nu își asumă nicio responsabilitate în cazul unei astfel de reutilizări. Resterilizarea dispozitivelor vândute este interzisă.

6. Îndepărțarea implantului după vindecare

- Implantul PIT'Stop trebuie să fie înălțat:
- la finalul perioadei de creștere când este utilizat în cazul pacientilor pediatrici; sau
- după 12 luni când este utilizat în cazul pacientilor adulți; sau
- dacă apar mai devreme dureri.

7. Depozitare

A se depozita într-un loc uscat.

8. IRM / SCANĂRI

Pacientul trebuie să fie rugat să mențină sistemul aparatului că are un implant chirurgical implantat în lângă piciorul.

Siguranța și compatibilitatea implantului PIT'Stop nu au fost evaluate pentru mediu RM. Nu s-a testat în ceea ce privește încărcarea, deplasarea sau arteficele de imagine într-un mediu RM. Siguranța implantului PIT'Stop într-un mediu RM este necunoscută. Scărirea unui pacient cu acest dispozitiv poate duce la vătămarea pacientului.

9. Informații privind produsele / Responsabilitate

Compania In2Bones a luat măsuri de precauție rezonabile în ceea ce privește alegerile materialelor și fabricarea acestor produse. Cu toate acestea, compania In2Bones nu oferă nicio garanție legală, expresă sau implicită, inclusiv nicio garanție implicită a calității vândutelor sau a decăvârrii pentru a anumita utilizare, dar fără limitare la aceasta, în niciun caz, compania In2Bones nu poate fi trasă la răspundere pentru niciun fel de pierdere, deteriorare ori costuri sau incidente conexe, legate direct sau indirect de utilizarea acestui produs.

Compania In2Bones nu își asumă și niciunul risc de către utilizatorii ambalajului și a fost deschis sau deteriorat în afara sălii de operație. Ambalajul interior trebuie să fie manipulat în condiții sterile (persoane/instrumente).

5.3. Postoperator

Pacientul trebuie să fie informat că la 12 luni după procedura inițială sau la finalul perioadei de creștere în cazul pacientilor pediatrici, se va efectua încă o procedură pentru îndepărțarea implanturilor.

- Este necesară efectuarea periodică de radiografii pentru a verifica progresul postoperator și a prevenii orice complicație.

- Trebuie să oferă pacientului instrucțiuni detaliate privind utilizarea și limitările dispozitivului. Dacă se recomandă o capacitate parțială de suportare a greutății sau aceasta este necesară înainte de unificarea fermă a oselor, pacientul trebuie să fie avertizat că înălțarea, slabirea sau rupearea componentelor sunt complicații care pot apărea din cauza suportării excesive sau timurii și greutății ori a activității musculare excesive.

Îngrijirea postoperatorie și terapia fizică trebuie să fie structurate în aşa fel încât să se prevină încarcătarea extremității operate, până când stabilitatea nu este evidentă.

- Pacientul trebuie să fie incurajat să-i raporteze chirurghilor orice apărare a unei infecții care poate apărea indiferent dacă aceasta apare în membrul operat sau în altă parte a organismului.

- Pacientul trebuie să fie incurajat să-i raporteze chirurghilor orice apărare a unei infecții care poate apărea indiferent dacă aceasta apare în membrul operat sau în altă parte a organismului.

- Pacientul trebuie să fie incurajat să-i raporteze chirurghilor orice apărare a unei infecții care poate apărea indiferent dacă aceasta apare în membrul operat sau în altă parte a organismului.

- Pacientul trebuie să fie incurajat să-i raporteze chirurghilor orice apărare a unei infecții care poate apărea indiferent dacă aceasta apare în membrul operat sau în altă parte a organismului.

- Pacientul trebuie să fie incurajat să-i raporteze chirurghilor orice apărare a unei infecții care poate apărea indiferent dacă aceasta apare în membrul operat sau în altă parte a organismului.

- Pacientul trebuie să fie incurajat să-i raporteze chirurghilor orice apărare a unei infecții care poate apărea indiferent dacă aceasta apare în membrul operat sau în altă parte a organismului.

- Pacientul trebuie să fie incurajat să-i raporteze chirurghilor orice apărare a unei infecții care poate apărea indiferent dacă aceasta apare în membrul operat sau în altă parte a organismului.

- Pacientul trebuie să fie incurajat să-i raporteze chirurghilor orice apărare a unei infecții care poate apărea indiferent dacă aceasta apare în membrul operat sau în altă parte a organismului.

- Pacientul trebuie să fie incurajat să-i raporteze chirurghilor orice apărare a unei infecții care poate apărea indiferent dacă aceasta apare în membrul operat sau în altă parte a organismului.

- Pacientul trebuie să fie incurajat să-i raporteze chirurghilor orice apărare a unei infecții care poate apărea indiferent dacă aceasta apare în membrul operat sau în altă parte a organismului.

- Pacientul trebuie să fie incurajat să-i raporteze chirurghilor orice apărare a unei infecții care poate apărea indiferent dacă aceasta apare în membrul operat sau în altă parte a organismului.

- Pacientul trebuie să fie incurajat să-i raporteze chirurghilor orice apărare a unei infecții care poate apărea indiferent dacă aceasta apare în membrul operat sau în altă parte a organismului.

- Pacientul trebuie să fie incurajat să-i raporteze chirurghilor orice apărare a unei infecții care poate apărea indiferent dacă aceasta apare în membrul operat sau în altă parte a organismului.

- Pacientul trebuie să fie incurajat să-i raporteze chirurghilor orice apărare a unei infecții care poate apărea indiferent dacă aceasta apare în membrul operat sau în altă parte a organismului.

- Pacientul trebuie să fie incurajat să-i raporteze chirurghilor orice apărare a unei infecții care poate apărea indiferent dacă aceasta apare în membrul operat sau în altă parte a organismului.

- Pacientul trebuie să fie incurajat să-i raporteze chirurghilor orice apărare a unei infecții care poate apărea indiferent dacă aceasta apare în membrul operat sau în altă parte a organismului.

- Pacientul trebuie să fie incurajat să-i raporteze chirurghilor orice apărare a unei infecții care poate apărea indiferent dacă aceasta apare în membrul operat sau în altă parte a organismului.

- Pacientul trebuie să fie incurajat să-i raporteze chirurghilor orice apărare a unei infecții care poate apărea indiferent dacă aceasta apare în membrul operat sau în altă parte a organismului.

- Pacientul trebuie să fie incurajat să-i raporteze chirurghilor orice apărare a unei infecții care poate apărea indiferent dacă aceasta apare în membrul operat sau în altă parte a organismului.

- Pacientul trebuie să fie incurajat să-i raporteze chirurghilor orice apărare a unei infecții care poate apărea indiferent dacă aceasta apare în membrul operat sau în altă parte a organismului.

- Pacientul trebuie să fie incurajat să-i raporteze chirurghilor orice apărare a unei infecții care poate apărea indiferent dacă aceasta apare în membrul operat sau în altă parte a organismului.

- Pacientul trebuie să fie incurajat să-i raporteze chirurghilor orice apărare a unei infecții care poate apărea indiferent dacă aceasta apare în membrul operat sau în altă parte a organismului.

- Pacientul trebuie să fie incurajat să-i raporteze chirurghilor orice apărare a unei infecții care poate apărea indiferent dacă aceasta apare în membrul operat sau în altă parte a organismului.

- Pacientul trebuie să fie incurajat să-i raporteze chirurghilor orice apărare a unei infecții care poate apărea indiferent dacă aceasta apare în membrul operat sau în altă parte a organismului.

- Pacientul trebuie să fie incurajat să-i raporteze chirurghilor orice apărare a unei infecții care poate apărea indiferent dacă aceasta apare în membrul operat sau în altă parte a organismului.

- Pacientul trebuie să fie incurajat să-i raporteze chirurghilor orice apărare a unei infecții care poate apărea indiferent dacă aceasta apare în membrul operat sau în altă parte a organismului.

- Pacientul trebuie să fie incurajat să-i raporteze chirurghilor orice apărare a unei infecții care poate apărea indiferent dacă aceasta apare în membrul operat sau în altă parte a organismului.

- Pacientul trebuie să fie incurajat să-i raporteze chirurghilor orice apărare a unei infecții care poate apărea indiferent dacă aceasta apare în membrul operat sau în altă parte a organismului.

- Pacientul trebuie să fie incurajat să-i raporteze chirurghilor orice apărare a unei infecții care poate apărea indiferent dacă aceasta apare în membrul operat sau în altă parte a organismului.

- Pacientul trebuie să fie incurajat să-i raporteze chirurghilor orice apărare a unei infecții care poate apărea indiferent dacă aceasta apare în membrul operat sau în altă parte a organismului.

- Pacientul trebuie să fie incurajat să-i raporteze chirurghilor orice apărare a unei infecții care poate apărea indiferent dacă aceasta apare în membrul operat sau în altă parte a organismului.

- Pacientul trebuie să fie incurajat să-i raporteze chirurghilor orice apărare a unei infecții care poate apărea indiferent dacă aceasta apare în membrul operat sau în altă parte a organismului.

- Pacientul trebuie să fie incurajat să-i raporteze chirurghilor orice apărare a unei infecții care poate apărea indiferent dacă aceasta apare în membrul operat sau în altă parte a organismului.

- Pacientul trebuie să fie incurajat să-i raporteze chirurghilor orice apărare a unei infecții care poate apărea indiferent dacă aceasta apare în membrul operat sau în altă parte a organismului.

- Pacientul trebuie să fie incurajat să-i raporteze chirurghilor orice apărare a unei infecții care poate apărea indiferent dacă aceasta apare în membrul operat sau în altă parte a organismului.

- Pacientul trebuie să fie incurajat să-i raporteze chirurghilor orice apărare a unei infecții care poate apărea indiferent dacă aceasta apare în membrul operat sau în altă parte a organismului.

- Pacientul trebuie să fie incurajat să-i raporteze chirurghilor orice apărare a unei infecții care poate apărea indiferent dacă aceasta apare în membrul operat sau în altă parte a organismului.

- Pacientul trebuie să fie incurajat să-i raporteze chirurghilor orice apărare a unei infecții care poate apărea indiferent dacă aceasta apare în membrul operat sau în altă parte a organismului.

- Pacientul trebuie să fie incurajat să-i raporteze chirurghilor orice apărare a unei infecții care poate apărea indiferent dacă aceasta apare în membrul operat sau în altă parte a organismului.

- Pacientul trebuie să fie incurajat să-i raporteze chirurghilor orice apărare a unei infecții care poate apărea indiferent dacă aceasta apare în membrul operat sau în altă parte a organismului.

- Pacientul trebuie să fie incurajat să-i raporteze chirurghilor orice apărare a unei infecții care poate apărea indiferent dacă aceasta apare în membrul operat sau în altă parte a organismului.

- Pacientul trebuie să fie incurajat să-i raporteze chirurghilor orice apărare a unei infecții care poate apărea indiferent dacă aceasta apare în membrul operat sau în altă parte a organismului.

- Pacientul trebuie să fie incurajat să-i raporteze chirurghilor orice apărare a unei infecții care poate apărea indiferent dacă aceasta apare în membrul operat sau în altă parte a organismului.

- Pacientul trebuie să fie incurajat să-i raporteze chirurghilor orice apărare a unei infecții care poate apărea indiferent dacă aceasta apare în membrul operat sau în altă parte a organismului.

- Pacientul trebuie să fie incurajat să-i raporteze chirurghilor orice apărare a unei infecții care poate apărea indiferent dacă aceasta apare în membrul operat sau în altă parte a organismului.

- Pacientul trebuie să fie incurajat să-i raporteze chirurghilor orice apărare a unei infecții care poate apărea indiferent dacă aceasta apare în membrul operat sau în altă parte a organismului.

- Pacientul trebuie să fie incurajat să-i raporteze chirurghilor orice apărare a unei infecții care poate apărea indiferent dacă aceasta apare în membrul operat sau în altă parte a organismului.

- Pacientul trebuie să fie incurajat să-i raporteze chirurghilor orice apărare a unei infecții care poate apărea indiferent dacă aceasta apare în membrul operat sau în altă parte a organismului.

- Pacientul trebuie să fie incurajat să-i raporteze chirurghilor orice apărare a unei infecții care poate apărea indiferent dacă aceasta apare în membrul operat sau în altă parte a organismului.

- Pacientul trebuie să fie incurajat să-i raporteze chirurghilor orice apărare a unei infecții care poate apărea indiferent dacă aceasta apare în membrul operat sau în altă parte a organismului.

- Pacientul trebuie să fie incurajat să-i raporteze chirurghilor orice apărare a unei infecții care poate apărea indiferent dacă aceasta apare în membrul operat sau în altă parte a organismului.

- Pacientul trebuie să fie incurajat să-i raporteze chirurghilor orice apărare a unei infecții care poate apărea indiferent dacă aceasta apare în membrul operat sau în altă parte a organismului.

- Pacientul trebuie să fie incurajat să-i raporteze chirurghilor orice apărare a unei infecții care poate apărea indiferent dacă aceasta apare în membrul operat sau în altă parte a organismului.

- Pacientul trebuie să fie incurajat să-i raporteze chirurghilor orice apărare a unei infecții care poate apărea indiferent dacă aceasta apare în membrul operat sau în altă parte a organismului.

- Pacientul trebuie să fie incurajat să-i raporteze chirurghilor orice apărare a unei infecții care poate apărea indiferent dacă aceasta apare în membrul operat sau în altă parte a organismului.

- Pacientul trebuie să fie incurajat să-i raporteze chirurghilor orice apărare a unei infecții care poate apărea indiferent dacă aceasta apare în membrul